
# RESPIFIN

### LIQUID

#### COMPOSITION:

Each 1,000ml contains:

Bromhexine50.000mgGuaiphenesin20,000mgAminophyline25,000mgMenthol25,000mgExcepientsQ/S



## RESPIFIN

#### COMPOSITION:

Each 1,000ml contains:	
Bromhexine	50.000mg
Guaiphenesin	20,000mg
Aminophyline	25,000mg
Menthol	25,000mg

Excepients ...... Q/S

#### INDICATIONS: INDICATIONS:

Respifin is highly effective as mucolytics expectorant that increase bronchial secretions & decreases the viscosity due to powerful combination of menthol and bromhexine. Also indicated to treat the symptoms that results from respiratory infections such as difficulty in breathing and sneezing in poultry. Highly effective to cure CRD, CCRD, E.Coli, Infectious Coryza, Fowl Cholera, Fowl Typhoid, Staphylococcus & Streptococcus.

SIDE EFFECT: Very much safe to use at recommended dosage.

#### DOSAGE:

Poultry: 50 ml/200 liters in D/W for 3-5 days.

Cattle Buffalo: 5ml/200 kg body weight per day for 3-5 days.

Sheep, Goat, Dog, Cat, Calves: 1-2 ml/20 kg body weight for 3-5 days. Dosage may be adjusted according to the severity of disease as recommended by the veterinarian.

#### PRECAUTIONS:

Shake well before use. Store in a cool & dry place. Keep away from reach of children.

سييفن ليوئية

ملامات:

رسپیفنسی آرڈی، سی سی آرڈی، کورائزہ ،سٹیفلوکوس اورسٹر پیٹوکوس انفیکشن میں سانس کی ترسیل میں آسانی پیدا کرتی ہے سائیڈ اِفیک : مقرر کردہ مقدار میں استعال کرنے سے کوئی سائیڈ اِفیک نہیں۔ خوراک وطریقہ استعال:

بولٹری: 50 ملی لیٹر 200 لیٹر پانی میں 3 سے 5 دن تک۔

گائے بھینس: 5 ملی لیٹر فی 200 کلوگرام وزن کے حساب سے دن میں 1 مرتبہ سلسل 3 دن تک۔

بھیٹر، بکری، کتی، بلی بچھڑے: 1 سے 2 ملی لیٹر 20 کلوگرام وزن کے حساب سے۔

دوا کی مقدار کوڈا کٹر کی ہدایات کے مطابق کم زیادہ کیا جاسکتا ہے۔

احتیاط:ڈاکٹر کی ہدایت کےمطابق استعال کریں۔دوا کو بچوں کی پہنچ سے دورر کھیں۔ ٹھنڈی اورخشک جگہ پر کھیں۔



